

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES RHONE-ALPES

AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE

ARBO. VITI. RHONE-ALPES

ABONNEMENT ANNUEL : 80 f

REGISSEUR RECETTES D.D.A. CCP LYON 9431-17A



Circonscription RHONE-ALPES

55, rue Mazenod 69426 LYON CEDEX 3

16 Septembre 1983

N° de série continue 266

Bulletin n° 22

ARBRES FRUITIERS

PECHER

DLP 20-9-83233527

LE DEPERISSEMENT BACTERIEN EN 1983 ?
- VENEZ VOUS INFORMER A LA REUNION

MARDI 20 SEPTEMBRE à 14 HEURES
Grande Salle du Crédit Agricole
290, rue Faventines - VALENCE

- LES TRAITEMENTS D'AUTOMNE CONTRE LA BACTERIOSE

- Le 1er traitement correspond au début de la chute des feuilles VISIBLE. Dans les conditions générales, il se situe dans la dernière décade de septembre. Il doit être modulé suivant les conditions particulières du verger (variétés, porte-greffe, etc...)

Types de produits

Ne pas se laisser convaincre par des "marchands de Produits miracles"

Ces mêmes produits s'avèrent, après essai, non seulement inefficaces, mais parfois capables d'accroître la maladie. Ainsi les chélates de zinc testées dans des expériences précises, sont incapables d'une quelconque protection. Les chélates de cuivre sont en cours d'expérimentation.

Seuls certains sels de cuivre permettent d'assurer une protection automnale acceptable.

On peut rappeler que la Bouillie Bordelaise Rhodia 25, la Bouillie Bordelaise RSR, et le Cupravit sont à ce jour les seules spécialités homologuées pour la lutte contre le Dépérissement Bactérien du Pêcher.

D'autres choix de traitements peuvent entraîner des déséquilibres graves dans la flore existant sur les feuilles à cette période.

Dates de traitement et rythmes

On rappellera en outre que :

- 2 traitements équivalent à ne rien faire
- 3 traitements sont au moins nécessaires
- Le 1er étant effectué impérativement dès le tout début de la chute des feuilles pour casser la multiplication des bactéries

En résumé, ne pas traiter en début de chute des feuilles est dangereux.

- Dose : 125 g de cuivre métal
- Intervalles : 10 - 12 jours maximum entre deux traitements
- Mieux vaut refaire un traitement s'il est lessivé

P469

LES TRAITEMENTS TELS QU'ILS SONT DEFINIS ICI SONT L'AFFAIRE DE TOUS.

. Sélectivité

Des cas graves de phytotoxicité due au cuivre ont été observés en région lyonnaise l'automne dernier. Pour limiter les dégâts on s'efforcera :

- de ne traiter que des arbres dont le feuillage est parfaitement ressuyé ;
- de traiter en milieu de journée et en absence de risque de pluie ;
- de ne pas traiter par temps de brouillard ;
- de se limiter à trois traitements dans la région lyonnaise où les risques de phytotoxicité sont plus grands.

- LA PLAQUETTE JOINTE FAIT LE POINT DES RESULTATS DES EXPERIMENTATIONS EFFECTUEES.